

## Consentimiento informado para usar anticoncepción de emergencia

Nombre \_\_\_\_\_ Fecha de nacimiento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Antes de dar su consentimiento, esté segura que entiende ambos los pros y las contras de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia o EC (por sus siglas en inglés). Si tiene preguntas, con todo gusto se las responderemos. No firme su nombre al final de este formulario hasta que haya leído y entendido completamente cada punto. Esta información es confidencial.**

### Entiendo que:

- Las pastillas anticonceptivas de emergencia contienen el mismo medicamento que las pastillas anticonceptivas comunes y pueden ayudar a prevenir el embarazo. Estas pastillas se toman después de haber tenido relaciones sexuales sin protección (si mi método anticonceptivo regular fracasa o tengo relaciones sexuales sin anticonceptivo).
- Las pastillas anticonceptivas de emergencia sólo se deben usar en casos de emergencia. No se deben tomar para reemplazar los métodos anticonceptivos habituales como “la píldora”, profilácticos, el parche anticonceptivo, inyecciones anticonceptivas, etc.
- La manera por la cual funcionan las pastillas anticonceptivas de emergencia (EC) es en deteniendo la salida del huevo del ovario (ovulación), o puede prevenir la unión de la esperma y huevo (fertilización), o puede prevenir el huevo fertilizado que se pegue al útero (implantación). Las pastillas (EC) no funcionarán después de la implantación del huevo fertilizado. EC no interrumpirá un embarazo establecido.
- Es mejor tomar las pastillas anticonceptivas de emergencia durante los 3 días siguientes de tener relaciones sexuales sin protección. Nueva información demuestra que a veces el EC puede prevenir embarazo hasta cinco días después de tener relaciones sexuales, pero cuanto antes tome el EC, más eficaz será.
- Las pastillas de anticoncepción de emergencia no son 100 por ciento efectivas.
- Reacciones a las pastillas pueden incluir náusea y vómitos, dolor de cabeza, dolor de estómago, mareo, sensibilidad de los senos, periodos menstruales adelantados o atrasados.
- Debo ver al médico si es que mi periodo no ha comenzado después de 3 semanas después del tratamiento.
- Debo usar un método regular de anticoncepción para prevenir embarazos si es que tengo relaciones sexuales antes de mi próximo periodo.
- Las pastillas de anticoncepción de emergencia no me protegerán, ni son tratamiento para las enfermedades transmitidas sexualmente, incluyendo VIH/SIDA.

**Sí \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Leí y entiendo toda la información.**

Firma de la paciente \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Firma del farmacéutico \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_